



日本薬局方 ヨクイニン末

ナカジマ ヨクイニン末

使用上の注意

第3類医薬品

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

服用の際は、用法・用量を守ってください

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量2gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。添付のさじ1杯は1gです

保管及び取扱上の注意

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでご注意下さい。
- ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
製造販売元 中嶋生薬株式会社
TEL.075-231-2633



4 936246 100753