

打撲・骨折・捻挫

ホンノ一打身薬

[散剤]

和漢薬

製造販売元

ホンノ一薬品株式会社

〒741-0062

山口県岩国市岩国1-13-12

【消費者相談窓口】

本剤の使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

お客様相談窓口

フリーダイヤル；0120-41-0317

営業時間；9：00～17：00（月～土曜日）

副作用被害救済制度の問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

ホンノー打身薬〔散剤〕は、9種の和漢薬を散剤にしたもので、打撲・骨折・捻挫により生じた内出血及び炎症を消散します。

負傷後、ホンノー打身薬〔散剤〕を服用すると、内出血及び諸症状（熱、はれ、痛み、黒いあざ等）を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

1. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - （4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - （5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - （6）次の医薬品を服用している人。
瀉下薬（下剤）

2. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、下痢

3. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能】 打撲・骨折・捻挫による内出血及び炎症を消散する。

【用法・用量】 大人1日3回、毎食間、水または白湯にて服用。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3 回
7歳以上 15歳未満	1/2包	
4歳以上 7歳未満	1/3包	
2歳以上 4歳未満	1/6包	
2歳以下	1/10包	

*食間とは食後2～3時間のことをいう。

<用法・用量に関する注意>

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分】 1日量（7.0g）中

日局オウバク末0.3g 日局シャクヤク末0.8g 日局ブクリョウ末0.8g
日局ダイオウ末0.7g 日局ソウジュツ末0.9g 日局トウキ末0.9g
日局カンゾウ末0.8g 日局センキュウ末1.0g 日局シュクシャ末0.8g

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

【包装】 21包（7日分）