

※2012年09月改訂

漢方煎剤 十全湯 じゅうぜんとう **第②類医薬品**

【成分・分量】

日局キキョウ 0.950g、日局カンゾウ 0.950g、日局ニンジン 1.875g
日局マオウ 0.630g、局外ナンテン 1.250g、日局オンジ 0.330g
日局ショウキョウ 0.750g、日局キョウニン 0.950g、日局カクコン 1.875g
日局ケイヒ 1.250g、日局シャクヤク 1.250g 日局タイソウ 0.750g
全量 1袋1日分 12.810g

【効能・効果】

せき・ぜんそく

【用法・用量】

1袋1日分を600mlの水で煎じる。300mlになるまで煎じつめる。
大人は1回量 100ml づつ1日3回食前に温服する。
15歳未満7歳以上は2/3、7歳未満4歳以上は1/2、4歳未満2歳以上は1/3、2歳未満は1/4以下とする。

【用法及び用量に関連する注意】

小児に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状の悪化や、副作用・事故が起こりやすくなる)

1、次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

(4) 胃腸の弱い人。

(5) 発汗傾向の著しい人。

(6) 高齢者。

(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(8) 次の症状のある人。

排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

(2) 1ヵ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密閉して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因や品質が変化する。)

【お問い合わせ先】

製品についてのお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。

株式会社仁生堂(じんせいどう)

電話(054)237-1865

受付時間 9:00～19:00(土、日、祝日を除く)

株式会社仁生堂(じんせいどう)

〒422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷二丁目5番1号

電話(054)237-1865 FAX(054)237-5340

第②類医薬品

十全湯 じゅうぜんとう

〔効能・効果〕 せき・ぜんそく

〔用法・用量〕 大人は1袋1日分を、水 600ml をもって煎じ、300ml に煎じつめ、100ml ずつ1日 3 回食前に温服する。
15才未満7才以上は 2/3、7才未満4才以上は 1/2、4才未満2才以上は 1/3、2才未満は 1/4 以下

〔成分・分量〕

日局	キキョウ	0.950g	日局	キョウニン	0.950g
日局	カンゾウ	0.950g	日局	カクコン	1.875g
日局	ニンジン	1.875g	日局	ケイヒ	1.250g
日局	マオウ	0.630g	日局	シャクヤク	1.250g
局外	ナンテン	1.250g	日局	タイソウ	0.750g
日局	オンジ	0.330g	全量	1袋1日分	12.810g
日局	ショウキョウ	0.750g			

〔ご 注 意〕 (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
(2) 服用の際には、添付文書をよくお読みください。
(3) 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に密閉して保管してください。

内 容 量 7 包 (7 日分)

製造発売元 株式会社 **仁 生 堂** どう

静岡県静岡市駿河区大谷二丁目5番1号

商品に関するお問い合わせはこちらへ
 ㈱仁生堂 おくすりなんでも相談
 (054) 237-1865

製造番号

www.pmda.go.jp 0120-149-931
 (株)医薬品医療機器総合機構
 副作用被害救済制度



生薬煎剂

十全湯

じゅう

ぜん

とう



株式
会社

仁生堂

じん

せい

どう

第②類医薬品